

VII. BERICHT.

Dr. Hans Adler.

M  
122



22101906407





# SIEBENTER BERICHT

über die

## Behandlung der Augenkranken

(vom 1. Jänner bis 31. December 1879)

im

k. k. Krankenhause Wieden und im St. Josef-Kinderspitale

vom ordinirenden Augenarzte

**Dr. Hans Adler.**

---

*Separatabdruck aus dem Berichte des k. k. Krankenhauses Wieden für das Jahr 1879.*

---

**WIEN.**

Selbstverlag des Verfassers.

1880.

WELLCOME LIBRARY
General Collections
M
122

68523



27089 028

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Coll.	welMOmec
Call	
No.	<del>WV</del>



## I. Im k. k. Krankenhause Wieden.

Der Bericht bezieht sich auf das Solarjahr 1879. Es wurden im Ganzen 1686 Augenkränke, davon 1480 ambulatorisch behandelt.

Seit dem Bestande der speciellen Augenbehandlung im k. k. Krankenhause Wieden (25. October 1872) wurden dasselbst im Ganzen 10.127 Augenkranke behandelt, und zwar vertheilen sich diese in folgender Weise:

Auf die Jahre

	Ambulatorium	Spitalbehandlung	Summe
1872 . . . .	91	21	112
1873 . . . .	862	208	1070
1874 . . . .	1024	214	1238
1875 . . . .	1153	251	1404
1876 . . . .	1201	242	1443
1877 . . . .	1289	233	1522
1878 . . . .	1422	230	1652
1879 . . . .	1480	206	1686

Es hat sich somit eine ununterbrochene Zunahme der Behandlungsziffer der Augenkranken überhaupt, besonders auch im heurigen, dem 8. Jahre ergeben.

Diese Vermehrung bezieht sich auf die ambulatorisch behandelten Kranken; ein Blick auf die Tabelle zeigt dagegen, dass hiemit keine Vermehrung der im Spitale Behandelten einhergeht. So ist die Anzahl der Spitalbehandelten im Jahre 1873 208, im Jahre 1879 206, während im Jahre 1873 nur 862, im Jahre 1879 1480 Augenkranke das hiesige Ambulatorium

aufsuchten. Da sich nun, wie bekannt, die Spitalbehandlung sehr häufig an die ambulatorische Behandlung anschliesst, ja sich naturgemäss die klinischen Fälle aus der Ambulanz recrutiren, so müsste fast die doppelte Anzahl von Spitalbehandelten verzeichnet werden können, wenn nicht, durch die hiesigen Verhältnisse bedingt, nur die dringendsten Fälle, die sogenannten „unabweisbaren“, bisher im Hause aufgenommen würden. Noch häufiger wie in früheren Jahren mussten Augenkranke wegen relativem Platzmangel abgewiesen werden.

Die Schwere der aufgenommenen Fälle ist ersichtlich aus der grossen Anzahl der vorgenommenen Operationen (101) und aus der grossen Anzahl der hierorts behandelten Verletzungen.

Und somit hat sich diese von der hohen n.-ö. Statthalterei bewilligte, von einer löblichen Direction geförderte Ambulanz auch heuer neuerdings erspriesslich erwiesen; die Spitalbehandlung der Augenkranken aber als ein constantes, den natürlichen Verhältnissen des k. k. Krankenhauses Wieden entsprechendes Bedürfniss bewährt.

Es folgt nun der nach den einzelnen Formen geordnete Ziffernbericht :

*I. Tabelle.*

1. Conjunctiva.	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
Conjunctivitis catarrh. acuta	75	48	123	9	7	16	139
„ „ chron.	25	43	68	6	2	8	76
„ epidemica . .	1	3	4	—	—	—	4
„ exanthematica	18	11	29	1	—	1	30
„ pustulosa . .	84	87	171	2	6	8	179
„ vesiculosa . .	5	3	8	—	—	—	8
„ blennorrh. ac.	1	2	3	4	4	8	11
„ „ neonat.	4	4	8	—	—	—	8
„ postvariolosa .	1	3	4	—	—	—	4
„ diphtheritica .	6	4	10	1	1	2	12
„ membranacea .	2	7	9	—	—	—	9
„ trachomatosa .	4	6	10	—	—	—	10
„ follicularis . .	8	—	8	—	—	—	8
„ granulosa (egypt.)	32	27	59	—	—	—	59
„ traumatica . .	9	6	15	1	—	1	16



	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
Hypoaema subconj. . . . .	4	1	5	—	—	—	5
Corpus alienum conj. . . . .	2	3	5	—	—	—	5
Combustio . . . . .	4	3	7	—	—	—	7
Xerosis . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Granuloma . . . . .	2	1	3	—	—	—	3
Pterygium . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	289	262	551	24	20	44	595

## 2. Cornea.

Keratitis superficialis . . .	9	6	15	4	4	8	23
„ parenchymatosa . . .	5	12	17	1	1	2	19
„ pustulosa . . . . .	22	35	57	8	9	17	74
„ punctata (postica) . . .	1	1	2	—	—	—	2
„ vasculosa . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
„ postvariolosa . . . . .	1	3	4	—	—	—	4
„ suppurativa . . . . .	1	2	3	1	—	1	4
„ neuroparalytica . . . . .	—	2	2	—	—	—	2
Exfoliatio corneae . . . . .	12	7	19	3	—	3	22
Ulcus corneae . . . . .	18	14	32	10	3	13	45
„ cum hypop. . . . .	4	3	7	3	1	4	11
„ serpens . . . . .	1	1	2	3	—	3	5
Abscessus corneae . . . . .	4	3	7	—	—	—	7
Keratitis traumatica . . . . .	18	2	20	—	—	—	20
Combustio . . . . .	3	1	4	1	3	4	8
Corpus alienum in cornea . . .	93	8	101	1	—	1	102
Pannus . . . . .	2	1	3	—	3	3	6
Maculae corneae . . . . .	12	17	29	1	—	1	30
Leucoma „ . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
„ „ adhaerens . . . . .	—	1	1	—	—	—	1
Cicatrix „ . . . . .	4	1	5	—	—	—	5
Ektasia „ . . . . .	2	1	3	—	—	—	3
Staphyloma „ . . . . .	3	7	10	1	3	4	14
Phthisis „ . . . . .	1	2	3	—	—	—	3
Summe .	218	131	349	39	25	64	413

## 3. Sclera.

Scleritis vera . . . . .	2	2	4	—	2	2	6
Episcleritis . . . . .	3	2	5	—	—	—	5
Summe .	5	4	9	—	2	2	11

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
4. Iris und Chorioidea.							
Hyperaemia iridis . . . . .	—	1	1	—	—	—	1
Iritis acuta . . . . .	12	5	17	1	2	3	20
„ chron. . . . .	8	5	13	2	4	6	19
„ traumatica . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Kerato-Iritis . . . . .	5	1	6	1	—	1	7
„ traumatica . . . . .	6	3	9	—	—	—	9
Ciliarreizung . . . . .	4	1	5	—	2	2	7
Iridokyklitis . . . . .	2	1	3	—	1	1	4
Iridochorioiditis . . . . .	4	—	4	1	—	1	5
Chorioiditis . . . . .	3	4	7	1	—	1	8
Prolapsus iridis . . . . .	2	—	2	—	—	—	2
Occlusio pupillae . . . . .	2	—	2	1	1	2	4
Synechiae posteriores . . . . .	2	1	3	—	—	—	3
Mydriasis . . . . .	—	1	1	—	—	—	1
Summe . . . . .	51	23	74	7	10	17	91

#### 5. Glaucoma.

Glaucoma simpl. chron. . . . .	—	3	3	2	1	3	6
„ chron. inflamm. . . . .	1	3	4	—	2	2	6
„ acutum . . . . .	1	—	1	1	1	2	3
„ haemorrhagicum . . . . .	—	1	1	—	1	1	2
„ absolutum . . . . .	—	2	2	—	—	—	2
Summe . . . . .	2	9	11	3	5	8	19

#### 6. Retina und Nervus opticus.

Hyperaemia retinae . . . . .	2	2	4	—	—	—	4
Anaemia „ . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Retinitis . . . . .	4	2	6	2	—	2	8
„ albuminurica . . . . .	1	—	1	1	—	1	2
„ pigmentosa . . . . .	2	1	3	—	—	—	3
„ haemorrhagica . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
Ablatio retinae . . . . .	3	5	8	—	—	—	8
Neuritis et Neuroretinitis . . . . .	2	1	3	1	—	1	4

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
Neuritis ex tumore cerebri	2	1	3	—	—	—	3
Decoloratio . . . . .	4	1	5	—	—	—	5
Atrophia nervi opt. . . .	6	2	8	—	1	1	9
Neoplasma (Glioma) . . .	1	1	2	—	—	—	2
Summe .	29	17	46	4	1	5	51

### 7. Corpus vitreum.

Musci volitantes . . . .	2	3	5	—	—	—	5
Opacitates corp. vitr. . .	1	2	3	—	—	—	3
Summe .	3	5	8	—	—	—	8

### 8. Lens.

Cataracta incipiens . . .	3	5	8	—	—	—	8
„ senilis . . . . .	2	4	6	1	4	5	11
„ complicata . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
„ polaris ant. . . . .	1	2	3	—	—	—	3
„ capsularis . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
„ perinuclearis . . . .	1	—	1	—	—	—	1
„ secundaria . . . . .	3	2	5	—	—	—	5
„ traumatica . . . . .	5	—	5	1	—	1	6
Luxatio lentis . . . . .	—	1	1	—	—	—	1
Summe .	17	14	31	2	4	6	37

### 9. Bulbus.

Contusio bulbi . . . . .	8	1	9	4	—	4	13
Vulnera „ . . . . .	2	1	3	5	—	5	8
Phthisis „ . . . . .	1	3	4	—	—	—	4
Panophthalmitis . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
Exophthalmus . . . . .	2	—	2	—	—	—	2
Affectio sympath. . . . .	2	—	2	2	—	2	4
Cysticercus . . . . .	—	1	1	—	—	—	1
Carcinoma . . . . .	1	—	1	1	—	1	2
Summe .	17	7	24	12	—	12	36

### 10. Amblyopiae.

Amblyopia ex abusu spirit.	6	—	6	1	—	1	7
„ „ „ nicot. tabac.	2	—	2	—	—	—	2
„ e. causa ignota .	3	1	4	1	1	2	6

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
Amblyopia e. causa centrali	1	2	3	—	—	—	3
„ cum decoloratione	1	—	1	—	—	—	1
Hemeralopia . . . . .	4	2	6	—	—	—	6
Nyktalopia . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	18	5	23	2	1	3	26

### 11. Refraction und Accommodation.

Myopia . . . . .	36	14	50	—	—	—	50
Hypermetropia . . . . .	18	20	38	—	—	—	38
Presbyopia . . . . .	13	3	16	—	—	—	16
Asthenopia . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Paresis accomodationis . .	2	1	3	—	—	—	3
Myodesopsia . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
Summe .	71	39	110	—	—	—	110

### 12. Muskelkrankheiten und Neurosen.

Paresis oculomot. part. . .	1	1	2	—	—	—	2
„ musculi ext. . . . .	2	3	5	—	—	—	5
Strabismus convergens . .	8	6	14	1	1	2	16
„ divergens . . . . .	1	2	3	—	1	1	4
Insufficiencia musc. int. .	4	2	6	—	—	—	6
Neuralgia superciliaris . .	4	1	5	—	—	—	5
Ptosis . . . . .	5	—	5	—	—	—	5
Herpes Zoster . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
Summe .	26	16	42	1	2	3	45

### 13. Orbita.

Neoplasma orbitae . . . .	4	1	5	—	—	—	5
Summe .	4	1	5	—	—	—	5

### 14. Apparatus lacrimalis.

Dacryocyst. acuta . . . .	5	8	13	—	2	2	15
„ chron. . . . .	—	15	15	—	—	—	15
„ suppurat. . . . .	1	6	7	2	—	2	9
Dacryoadenitis . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
Fistula facci lacrimalis . .	2	3	5	—	—	—	5
Summe .	9	33	42	2	2	4	46

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
15. Palpebra.							
Oedema palp. . . . .	7	4	11	—	—	—	11
Erysipelas . . . . .	5	2	7	—	—	—	7
Eczema . . . . .	7	4	11	1	—	1	12
Abscessus . . . . .	6	2	8	1	1	2	10
Blepharoadenitis . . . .	17	24	41	1	—	1	42
Hordeolum . . . . .	13	16	29	—	—	—	29
Chalazeon . . . . .	2	3	5	—	—	—	5
Infarct. Meibomian. . . .	3	5	8	—	—	—	8
Verruca . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
Furunculus . . . . .	3	1	4	—	—	—	4
Neoplasma . . . . .	1	—	1	1	—	1	2
Emphysema . . . . .	2	—	2	—	—	—	2
Contusio palp. . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Vulnus . . . . .	1	1	2	—	—	—	2
Combustio . . . . .	1	—	1	—	—	—	1
Blepharospasmus . . . .	4	3	7	—	—	—	7
Ektropium . . . . .	2	1	3	1	—	1	4
Entropium . . . . .	1	4	5	—	6	6	11
Distichiasis et trichiasis .	1	5	6	1	1	2	8
Symblepharon . . . . .	—	1	1	—	—	—	1
Summe . . . . .	78	77	155	6	8	14	169

## II. Uebersichtstabelle.

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
1. Conjunctiva . . . . .	289	262	551	24	20	44	595
2. Cornea . . . . .	218	131	349	39	25	64	413
3. Sclera . . . . .	5	4	9	—	2	2	11
4. Iris und Chorioidea . .	51	23	74	7	10	17	91
5. Glaucoma . . . . .	2	9	11	3	5	8	19
6. Retina und Nervus opt.	29	17	46	4	1	5	51
7. Corpus vitreum . . . .	3	5	8	—	—	—	8
8. Lens . . . . .	17	14	31	2	4	6	37
9. Bulbus . . . . .	17	7	24	12	—	12	36
10. Amblyopiae . . . . .	18	5	23	2	1	3	26



	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
11. Refraction und Accomodation . . . . .	71	39	110	—	—	—	110
12. Muskelkrankheiten und Neurosen . . . . .	26	16	42	1	2	3	45
13. Orbita . . . . .	4	1	5	—	—	—	5
14. Apparatus lacrimalis . . . . .	9	33	42	2	2	4	46
15. Palpebra . . . . .	78	77	155	6	8	14	169
Am 1. Jänner 1879 war der Stand . . . . .	—	—	—	14	10	24	24
Totalsumme . . . . .	837	643	1480	116	90	206	1686

III. Tabelle der Aufnahme.

	Ambulatorium	Spitalbehandlung			Summe
		M.	W.	Z.	
1879 Jänner . . . . .	95	8	10	18	113
Februar . . . . .	98	10	3	13	111
März . . . . .	112	6	5	11	123
April . . . . .	130	6	9	15	145
Mai . . . . .	137	7	7	14	151
Juni . . . . .	152	7	7	14	166
Juli . . . . .	196	8	3	11	207
August . . . . .	173	10	6	16	189
September . . . . .	107	9	12	21	128
October . . . . .	91	10	9	19	110
November . . . . .	93	10	5	15	108
December . . . . .	96	11	4	15	111
Verblieben 1878 . . . . .		14	10	24	24
Totalsumme . . . . .	1480	116	90	206	1686

1879

IV. Tabelle nach dem Wohnort der Patienten.

	Ambulatorium	Spitalbehandlung	Summe
I. Bezirk . . . . .	55	4	59
II. „ . . . .	12	3	15
III. „ . . . .	43	8	51
IV. „ . . . .	445	41	486
V. „ . . . .	269	51	320
VI. „ . . . .	26	6	32

	Ambulatorium	Spitalbehandlung	Summe
VII. Bezirk . . . . .	9	2	11
VIII. „ . . . . .	8	3	11
IX. „ . . . . .	6	1	7
X. „ . . . . .	494	48	542
N.-Oe., besonders die Vororte .	101	33	134
Andere Kronländer . . . . .	12	6	18
Totalsumme .	1480	206	1686

Das Ueberwiegen der männlichen Kranken, sowohl der im Ambulatorium, als auch der im Krankenhause Behandelten, ist auch heuer zu constatiren, und ist dies besonders durch das nahezu ausschliessliche Vorkommen von Verletzungen bei Männern bedingt.

Conjunctiva, Cornea und Palpebra liefern, was Erkrankungsformen anlangt, wie immer, auch diesmal das grösste Contingent.

Von den im Krankenhause Behandelten wurden 6 Männer und 6 Weiber transferirt auf andere Abtheilungen, 9 Männer, 7 Weiber gebessert, 1 Mann, 3 Weiber ungeheilt, der Rest geheilt entlassen.

Die Verpflegszeit ergibt per Kopf 27·3 Tage.

*Operations-Bericht für die im Spitale Verpflegten.*

Lens.

	S. D.	E. D.	N. S. D.	S.
Extraction (nach Graefe). . . . .	2	—	—	2
Extractio linearis (nach Friedrich Jäger) .	2	—	—	2
Discissio cataractae (wegen eat. secund.) .	2	—	—	2

Iris.

Iridectomien:

wegen Glaucom . . . . .	8	1	—	9
zu optischen Zwecken . . . . .	5	—	—	5
wegen inflam. Processe (Iritis chronica)	6	—	—	6
wegen Staphylom . . . . .	—	1	—	1
Abtragung der Prolapsus Iridis . . . .	5	—	—	5

Cornea.

Punctionen . . . . .	10	3	1	14
Keratotomien (nach Saemisch) . . . . .	4	1	—	5

	S. D.	E. D.	N. S. D.	S.
Staphylom-Operation (nach Beer) . . . . .	2	—	—	2
„ „ ( „ Critchett) . . . . .	1	—	—	1
Conjunctiva.				
Circumcisio conj. . . . .	4	—	—	4
Ablatio verrucae conj. . . . .	1	—	—	1
Palpebra.				
Atheroma . . . . .	3	—	—	3
Trichiasis-Operation (Flarer) . . . . .	7	—	—	7
Ectropium-Operation (Beer) . . . . .	2	—	—	2
Canthoplastik . . . . .	1	—	—	1
Abscesse, Chalazeen . . . . .	7	—	—	7
Bulbus.				
Enucleatio bulbi:				
wegen sympath. Affection . . . . .	2	—	—	2
wegen Staphyloma . . . . .	1	—	—	1
Orbita.				
Eventratio orbitae				
cum cochlea aeri . . . . .	1	—	—	1
Musculi.				
Strabotomia int. . . . .	4	—	—	4
„ ext. . . . .	2	—	—	2
Organum lacrymale.				
Operation nach Petit . . . . .	1	—	—	1
„ „ Bowman . . . . .	11	—	—	11
<hr/>				
Totalsumme . . . . .	94	6	1	101

Ambulatorisch wurden 99 Fremdkörper aus der Cornea, 5 aus der Conjunctiva extrahirt, und zwar 73mal Eisenstückchen, 4mal Messingsplitter, 11mal Sand, 3mal Schmirgel, 6mal Kohle, 2mal Insectenflügel, 5mal Fremdkörper nicht bestimmten Charakters. Abscesse der Lider, Chalazeen, Operationen nach Bowman und Petit, Punctionen der Cornea, Tätowirungen wurden in Summa 79 vorgenommen, so dass die Gesamtsumme der vorgenommenen Operationen 180 beträgt.

Es folgen die im Hause behandelten Traumen, nach dem Hauptsitze der Verletzung zusammengestellt.

Fortlauf. Nr.	Sitz d. Verletz.	Verletztes Auge	Zustand des 2. Auges	Art u. Ursache der Verletzung	Verschieden	Name und Beschäftigung	Alter	Wohnort	Diagnose und Status praesens	Complicationen	Schvermögen	Verlauf	Therapie	Ausgang	Zeitraum seit d. Verletzung	Tag der Aufnahme	Tag der Entlassung	Behandlungsdauer	Schwere der Verletzung
1	Palpebra			Terpen- tinöl	bei der Arbeit	A. H., Fabriks- arbeiter	39	V.	Eczema palpebr.	Eczema faciei et anti- brach. utr. Catar- rhus conj.	S = 20/30	Normal	Unguent. diachyl. Hebra (Maske)	Röthung d. Lidhaut	2 Tage	27. 10.	5. 11	10	leicht
2		R.	S = 20/20	Rauf- handel		S. S., Tag- löhner	46	Breiten- see	Echymoma conj. et palpebr.		S = 20/20	Normal	Kalte Umschläge	Normal	1 Tag	2. 7.	4. 7.	3	leicht
3		R.	S = 20/20	Rauf- handel, m. einem Trink- glas	Fremdes	Ch. J., Tag- löhner	28	Oberlaa	Ectropium palp. sup. dextr. durch eine Narbe bedingt	Lago- phthal- mus Cat. conj.	S = 20/20	Normal	Cantho- plastik	Lago- phthalmus beheben	6 Wo- chen	1. 6.	23. 6.	23	schwer
4	Cornea			Schlag m. einem Blechge- fäß	durch Unvor- sichtig- keit	T. R., Tag- löhnerin	42	Marga- rethen am Moos	Vulnus contusum corneae d. Ulcus corneae cum hypopio.			Normal	Kerato- tomie nach Saemisch. Iridecto- mia nach innen	Centrale Narbe. Breites Colobom	14 Tage	27. 8	13. 10.	49	schwer
5		R.		Schwe- felsäure	bei der Arbeit	St. M., Fabriks- arbei- terin	40	IV.	Combustio cor- neae dextr. gradus gravis	Com- bustio faciei	Finger- zählen in 1 Met.	Keratitis ulcerosa c. hypopio.	Eserin, Punctio corneae 2mal	Maculae corneae diffus.	4 Tage	7. 10.	24. 10.	18	schwer

Fortlauf. Nr.	Sitz d. Verletz.	Verletztes Auge	Zustand des 2. Auges	Art u. Ursache der Verletzung	Verschulden	Name und Beschäftigung	Alter	Wohnort	Diagnose und Status praesens	Complicationen	Sehvermögen	Verlauf	Therapie	Ausgang	Zeitraum seit d. Verletzung	Tag der Aufnahme	Tag der Entlassung	Behandlungsdauer	Schwere der Verletzung
6	R.	Normal	Kalk	Znfall	K. H., Schml-kind	8	X.		Combustio corneae dextr. gradus gravis	Combustio conjunctivae	Lichtempfindung	Keratitis ulcerosa	Entfernung von Kalk; Oel, Atropin, Eisumschläge	Symblepharon, Macul. corn	8 Tage	30. 10. 1878	4. 1.	67	schwer
7	L.	Normal	Glühendes Eisensstück	bei der Arbeit	K. W., Schlosser	19	V.		Combustio corneae sin superficial. Ein 1 Mm. breiter, von oben nach unten ziehender Epithelialverlust der Cornea	Combustio palpebrae et conjunct.		Normal	Atropin-Verband	Restitutio ad integrum	1 Stunde	7. 2.	27. 2.	21	leicht
8	L.	S = 20/20	Schwefelsäure	Fremdes (aus Rache)	C. L., Gärbär	28	X.		Combustio corneae et sin. sclerae	Combustio palpebrae et conjunct.	Lichtempfindung	Keratitis ulcerosa	Eisumschläge, Oel, Atropin-Verband	Macul. corn. diffus. Pterygium	5 Stunden	3. 6.	7. 7.	35	schwor
9	L.	S = 20/20	Grane (von Gerste)	bei der Arbeit	K. S., Knoch	26	Oberla N.-Oe.		Ulcus corneae traumaticum. Ein 3 Mm. im Durchmesser be- tragender cen- traler Substanz- (Epithelial-) Ver- lust			Normal	Atropin-Verband, Punctio corneae	Macul. corn. con- tralis	2 Tage	14. 6.	11. 7.	28	schwor



10	L.		Holzsplitter	bei der Arbeit	W. R., Tischler	19	V.	Ulcus corneae traumaticum.			Normal	Atropin-Verband	Macul. corn.	14 Tage	3. $\frac{26}{7}$ .	24	leicht
11	L.	S = $\frac{1}{12}$	Stein	bei der Arbeit	M. J., Bahnarbeiter	66	Simmering	Ulcus corneae c. hypopio. Centrales Hornhautgeschwür, Hypopium erreicht den Pupillarrand	Lichtempfindung	Normal	Paracentesis corneae, Atropin-Verband	Macul. Fern. Fin-gerzählen auf $1\frac{1}{2}$ Meter Entfernung. Glas-körper-trübung	8 Tage	12. $\frac{23}{7}$ .	43	schwer	
12	L.	$\frac{1}{6}$	Eisen-splitter	bei der Arbeit	S. J., Schleser	17	Simmering	Ulcus corneae traum.		Normal	Atropin-Verband	Restitutio ad integrum	13 Tage	22. $\frac{4}{9}$ .	13	leicht	
13	R.	$\frac{1}{6}$	Granit-splitter	bei der Arbeit	T. F., Tagelöhner	59	Oberlaa	Ulcus corneae traumaticum. c. hypopio. Randständiges Geschwür	Lichtempfindung	Normal	Paracentesis corneae, Eserin	Macul. corn.	8 Tage	23. $\frac{20}{9}$ .	59	schwer	
14	R.	$\frac{1}{6}$	Fanstschiag	Fremdes	Z. B., Tagelöhner	36	Inzersdorf am W.-Berg	Contusio bulbi, Ciliar-Injection	$\frac{1}{9}$	Normal	Kalte Umschläge, Atropin	Restitutio ad integrum	1 Tag	13. $\frac{16}{1}$ .	4	leicht	
15	L.	$\frac{1}{5}$	Kupfer-splitter	bei der Arbeit	S. E., Kesselschmied	23	Simmering	Vulnus punctum c. sin. Stichwunde im Centrum der Hornhaut	Lichtempfindung	Chorioiditis	Hirudines Laxans, Eisumschläge, Eserin	Papillenschwarte, keine Lichtempfindung	1 Tag	12. $\frac{10}{2}$ .	27	schwer	

Fortlauf. Nr.	Sitz d. Verletz.	Verletztes Auge	Zustand des z. Auges	Art u. Ursache der Verletzung	Verschulden	Name und Beschäftigung	Alter	Wohnort	Diagnose und Status praesens	Complicationen	Sehvermögen	Verlauf	Therapie	Ausgang	Zeitraum seit d. Verletzung	Tag der Aufnahme	Tag der Entlassung	Behandlungsdauer	Schwere der Verletzung
16	L.		6/c	Steinwurf	Fremdes	K. J., Tagelöhner	22	Weidlingau	Vulnus contusum b. sin. 16 Mm. lange, von oben nach unten verlaufende Wunde der Horn- und Lederhaut, mit Zerreissung und Vorfall der Iris und Choroiden	Cataracta traumatica	Lichtempfindung	Panophthalmitis	Abtragung der vorgelegerten Iris. Antiphlogistisch	Phthisis bulbi	5 Stunden	27. 2.	15. 4.	48	schwer
17	K.		6/c	Glähendes Eisenstück (1/2 Zoll lang mit scharfen Rändern)	bei der Arbeit	M. F., Schmied	35	X.	Vulnus contusum o. d. Horizontal verlaufende, klaffen- de, mit scharfen Rändern versehene Continuitätsstrennung der Hornhaut, mit Zerreissung und Vorfall der Iris und Choroiden	Cataracta traumatica	Keine Lichtempfindung	Drucksteigerung, bedingt durch Aufquellen d. verletzten Linse. Erbrechen und unerträgliche Schmerzen	Abtragung der vorgelegerten Iris und Choroiden. Hirudines Laxans, Eisumschläge. 20% Paraceticis corneae behufs Entfern- ung der Cataractamassen	Cicatrix corneae, Kammer theilweise hergestellt Iris und Choroiden. alcolobom. Lichtempfindung	1 Stunde	8. 5.	14. 6.	38	schwer

18	L.	$\frac{6}{16}$	Stockschlag	Raufhandel	B. R., Musiker	21	IV.	Contusio bulbi s. Hypohaema	Sugillatio- nes palpebr.	Handbe- wegung auf 0.5 Meter	Normal	Kalte Um- schläge, Verband, Pilocarpin- Injectio- nen	Glas- körper- trübung S = $\frac{6}{16}$ mühsam	2 Tage	$\frac{1.}{7.}$	$\frac{23.}{7.}$	23	schwer
19	R	$\frac{6}{16}$	Stockschlag	Raufhandel	U. J., Tagelöhner	45	Wekersdorf	Vulnus contusum b. dextr. Hypohaema	Vulnus contus. palpebr. dextrae	Schwache Licht- empfindung	Normal	Kalte Um- schläge, Atropin- Verband	Glas- körper- trübung S = $\frac{6}{16}$ mühsam	4 Tage	$\frac{17.}{7.}$	$\frac{13.}{8.}$	28	schwer
20	L.	$\frac{6}{16}$	Schnitt mit Messer	Raufhandel	R. W., Tagelöhner	18	X.	Contusio bulbi sin. Vulnus scis- sum palpebr. 1 Cm. lange In- penwunde des linken oberen Lides. Spannung des linken Bulbus bedeutend ge- ringer		S = $\frac{6}{64}$ mühsam	Normal	Kalte Um- schläge Atropin- Verband	S = $\frac{6}{16}$ prompt	4 Tage	$\frac{25.}{9.}$	$\frac{7.}{10.}$	12	schwer
21	L.	$\frac{6}{16}$	Abspringendes Eisen- stück	bei der Arbeit	J. A., Eisen- dreher	22	X.	Vulnus punctum bulbi sin. 3 Mm. hinter dem Cornealrand ein- 2 Mm. lange Stichwunde der Sclera mit Glas- körpervorfall	Vulnus lacer. palpebr. sup. sin.	Finger- zählen in 1 Met	Normal (Gelbschen)	Morphin- Injection, Druckver- band, Pilocarpin- Inject.	Auf Pilo- carpin trat auffallen- des Besser- sehen ein S = $\frac{6}{12}$	6 Stunden	$\frac{10.}{11.}$	$\frac{6.}{12.}$	27	schwer
22	R.	$\frac{6}{16}$	Abspringendes Eisen- stück	bei der Arbeit	K. W., Eisen- dreher	30	X.	Contusio bulbi d. Hypohaema	Vulnus lacer. conjuncti- vae bulbi	S = $\frac{6}{24}$	Normal	Kalte Um- schläge, Atropin- Verband	S = $\frac{6}{12}$	3 Stunden	$\frac{18.}{11.}$	$\frac{22.}{11.}$	5	schwer

## II. Im St. Josef-Kinderspitale \*).

Im Ganzen wurden im Jahre 1879 daselbst 400 augen-  
kranke Kinder behandelt. Davon waren 359 in ambu-  
latorischer, 41 in Spitalbehandlung.

---

\*) Der Detailbericht ist im „38. Jahresberichte des St. Josef un-  
entgeltlichen Kinderspitals 1879“ enthalten.















